

AMALGAM RESTORASYONA BAĞLI GELİŞEN ORAL LİKENOİD LEZYONUN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE KONSERVATİF YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU

ÇİĞDEM ŞİŞMAN¹, ALİCAN KURAN¹, UMUT SEKİ¹, ENVER ALPER SİNANOĞLU¹

¹KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI KOCAELİ, TÜRKİYE



AMAÇ

Oral likenoid lezyonlar, klinik olarak çoğunlukla keratotik çizgiler veya beyaz plak şeklinde görülen ve ayırıcı tanıda en sık retiküler tip oral liken planus ile ayrılması gereken ağız mukozası hastalıklarıdır. Oral liken planus ve oral likenoid lezyonlar, bazı araştırmacılar tarafından aynı hastalığın farklı formları olarak değerlendirilmiş olsa da, güncel yaklaşımlarda iki ayrı hastalık olarak kabul edilmekte ve oral potansiyel malign hastalıklar arasında sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, bu iki lezyonun histopatolojik olarak ayırt edilmesi çoğu zaman güç olabilmektedir. Bununla birlikte, tedavi yaklaşımlarının önemli farklılıklar göstermesi nedeniyle doğru tanının konulması büyük önem taşımaktadır. Bu olgu sunumunun amacı, dental amalgam restorasyonuna bağlı gelişen bir oral likenoid reaksiyon vakasını bildirmek ve ilgili restorasyonun değiştirilmesinin ardından herhangi bir invaziv işlem veya farmakolojik tedavi gereksiz gözlenen klinik iyileşmeyi sunmaktır.

OLGU SUNUMU

Hasta: 45 yaşında, sistemik sağlıklı kadın.

Şikayet: Rutin dental kontrol.

Lezyon Lokalizasyonu: Dilin sol posterolateral bölgesi (unilateral).

Lezyon Özelliği: Silmekle uzaklaştırılamayan beyaz plak ve ışınal uzanım gösteren keratotik beyaz çizgilenmeler (Wickham benzeri yapılar).

Lokal Faktörler: Lezyonun, üst çene sol birinci premolar (24 no'lu diş) üzerindeki geniş amalgam restorasyon ile direkt temas halinde olduğu saptandı.

Ön Tanı: Oral Likenoid Kontakt Lezyon (Amalgama bağlı reaktif yanıt).

Ayırıcı Tanı: Oral Liken Planus (OLP).

Tedavi: Farmakolojik tedavi veya invaziv biyopsi öncesi lokal irritanın eliminasyonu planlandı. 24 numaralı dişteki amalgam restorasyon uygun bir restoratif materyal ile değiştirildi.

Takip ve Prognoz: Restorasyonun değiştirilmesinin ardından yapılan ara kontrol muayenesinde lezyonun belirgin şekilde gerilediği gözlemlendi. Lezyonun asemptomatik olması nedeniyle hasta takibe alındı. Altıncı ay klinik kontrolünde lezyonun tamamen iyileştiği tespit edildi.

SONUÇ

Amalgama bağlı gelişen oral likenoid reaksiyonlar, oral liken planus ile klinik olarak büyük benzerlik göstermektedir. Oral liken planus olgularında çoğu durumda biyopsi ve medikal tedavi gerekebilirken, oral likenoid lezyonlarda etiyolojik faktörün ortadan kaldırılması genellikle tedavi için yeterli olmaktadır. Lezyonun yalnızca restorasyon ile temas eden alan ile sınırlı olması, önemli bir tanısal bulgu olarak değerlendirilmektedir. Oral lezyonların değerlendirilmesinde ayırıcı tanılarının ve uygun klinik yaklaşımlarının bilinmesi, doğru tanının konulmasını sağlamakta ve gereksiz biyopsi ile medikal tedavilerin önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler:Likenoid lezyon;Amalgam;Wickham;Mukoza